

1. **Regio epigastrica ndodhet në:**
 - a. katin e sipërm të abdomenit
 - b. katin e mesëm të abdomenit
 - c. katin e poshtëm të abdomenit
2. **Regio umbilicalis ndodhet në :**
 - a. epigastrium
 - b. mesogastrium
 - c. hypogastrium
3. **Regio publica ndodhet në:**
 - a. epigastrium
 - b. mesogastrium
 - c. hypogastrium
4. **Në cilat nga këto regjione ndodhet epigastriumi:**
 - a. regio epigastrica, regio hypocondriaca dextra et sinistra
 - b. regio umbilicalis, regio inguinalis dextra et sinistra
 - c. regio publica, regio lateralis dextra et sinistra
5. **Në cilat nga këto regjione ndodhet mesogastriumi:**
 - a. regio epigastrica, regio umbilicalis et region publica
 - b. regio umbilicalis, regio lateralis dextra et sinistra
 - c. regio lateralis dextra et sinistra, regio epigastrica
6. **Në cilat nga këto regjione ndodhet hypogastriumi:**
 - a. regio umbilicalis, regio hypocondriaca dextra et sinistra
 - b. regio publica, regio inguinalis dextra et sinistra
 - c. regio lateralis dextra et sinistra, regio epigastrica
7. **Cilat janë katet e abdomenit?**
 - a. Epigastrium, mesogastrium et hypogastrium
 - b. regio umbilicalis, regio epigastrica et regio inguinalis
 - c. regio epigastrica, regio mesogastrica et regio hypogastrica
8. **Njëra ndër lidhjet e fascia superfascialis abdominalis në regjionin e simfizës pubike:**
 - a. lig .pectineale
 - b. lig. lacunare
 - c. fibrae intercrurales
9. **Sipërfaqja e jashtme e skajeve belokurrizore deltoide të michaelisit në thellësi i përgjigjen këtyre elementeve në eshtra:**
 - a. spina iliaca anterior superior
 - b. spina iliaca posterior superior
 - c. spina iliaca posteror inferiors
10. **Musculus rectus abdominis inervohet nga nervat si:**
 - a. nn. intercostalisV, XI et n.lumbalis I
 - b. nn. intercostalisVII, XII et n.lumbalis I

- c. nn. intercostalis VII, XII et n. lumbalis III

11. Musculus transversus abdominis inervohet nga:

- a. nn. intercostales VI-XII et n. lumbales I
- b. nn. intercostales VII-XII et nn. lumbales I-II
- c. nn. intercostales VII-XII et n. lumbales I

12. Musculus obliquus abdominis internus inervohet nga këta nerva:

- a. nn. intercostales VII-XII et n. lumbalis I
- b. nn. intercostales VI-XII et n. lumbalis I
- c. nn. intercostales V-XII et n. lumbalis III

13. Skaji i pasëm i m. transversus abdominis lidhet në:

- a. tri brinjët e fundit
- b. gjashtë brinjët e fundit
- c. pesë brinjët e fundit

14. Prelum abdominalis ndihmon zbritjen e këtyre organeve:

- a. lukthit, zorrës së trashë, fshiksës së urinës dhe të mitrës
- b. lukthit, zorrës së trashë dhe kanaleve biliare
- c. fshikës së urinës, mitrës, zorrës së trashë dhe veshkëve

15. Prelum abdominalis krijohet me kontrahimin e përbashkët të këtyre muskujve:

- a. m. rectus abdominis, diafragma et m. latissimus dorsi
- b. m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis et m. quadratus lumborum
- c. të gjithë muskujt e murit anterolateral të abdomenit dhe diafragma

16. Cilat janë përforcimet e fascia transversalis abdominalis në murin abdominal?

- a. lig. Inguinale, lig. interfoveolare et septum femorale
- b. lig. interfoveolare, septum femorale et fascia umbilicalis
- c. lig. Lacunare, lig. pectinale et fascia umbilicalis

17. Cilat janë hapjet e kanalit inguinal?

- a. annulus inguinalis superficialis et annulus femoralis
- b. annulus inguinalis profundus et annulus inguinalis superficialis
- c. annulus inguinalis profundus et fovea inguinalis lateralis

18. Cilat janë përforcimet e murit të prapëm të kanalit inguinal?

- a. lig. interfoveolare, lig. reflexum et falx aponeurotica
- b. lig. interfoveolare, tendo conjunctivus et lig. lacunare
- c. lig. reflexum, falx aponeurotica et lig. pectineale

19. Annulus inguinalis superficialis e kufizojnë:

- a. crus laterale, crus mediale et tendo conjunctivus
- b. crus laterale, crus mediale et fibra intercrurales
- c. fibra intercrurales, septum femorale et lig. reflexum

20. Herniet inguinale direkte kalojnë nëpër këto struktura:

- a. fossa inguinalis medialis, muri i pasëm i kanalit inguinal dhe annulus inguinalis superficialis
- b. fossa inguinalis medialis dhe annulus inguinalis et annulus inguinalis superficialis
- c. fossa inguinalis lateralis, canalis inguinalis et annulus inguinalis superficialis

21. Herniet inguinale indirekte kalojnë nëpër këto struktura:

- a. fossa inguinalis lateralis, muri i përparëm i kanalit inguinal, canalis inguinalis, annulus inguinalis superficialis
- b. fossa inguinalis lateralis, anulus inguinalis profundus, canalis femoralis, annulus inguinalis superficialis
- c. fossa inguinalis lateralis, anulus inguinalis profundus, canalis inguinalis, annulus inguinalis superficialis

22. Palët e peritoneumit parietal në murin e përparëm të abdomenit janë:

- a. lig. umbilicale medium, lig. umbilicalia lateralia et plica epigastrica
- b. plica umbilicalis mediana, plica umbilicalis lateralis et plica epigastrica
- c. plica umbilicalis media, plica umbilicalis medialis et plica umbilicalis lateralis-epigastrica

23. Gropat e peritoneale në murin e përparëm të abdomenit janë:

- a. fossa vesicalis, fossa inguinalis medialis et fossa inguinalis lateralis
- b. fossa supravesicalis, fossa inguinalis medialis et fossa inguinalis lateralis
- c. fossa vesicalis, fossa umbilicalis medialis et fossa umbilicalis lateralis

24. Dyfishimet e peritoneumit visceral janë:

- a. mesenterium, lig. pancreaticolienalis et plica umbilicalis mediana
- b. mezenteret, ligamentet, omentumet
- c. mesocolon, omentum majus et plica umbilicalis lateralis

25. Cilat mure i ka bursa omentalis?

- a. murin e përparëm, të pasëm dhe të sipërm
- b. murin e përparëm, të pasëm dhe të poshtëm
- c. murin e përparëm, të pasëm dhe të djathtë

26. Murin e pas të kanalit inguinalis e ndërtojnë:

- a. fascia inguinalis
- b. fascia transversalis
- c. fascia umbilicalis

27. Cilat nga recessuset e përmendura janë recessuse të bursa omentalis?

- a. recessus superior omentalis, recessus inferior omentalis et recessus lienalis
- b. recessus posterior omentalis, recessus superior omentalis et recessus lienalis
- c. recessus gastricus omentalis, recessus lienalis et recessus omentalis superior

28. Murin e poshtëm të bursa omentalis e formojnë:

- a. lukthi
- b. pancreasi
- c. mesocolon transversum

29. Murin e përparëm të bursa omentalis e formojnë:

- a. omentum minus, gaster et lig. gastrocolicum
- b. gaster, pancreas et omentum minus
- c. omentum majus, omentum minus et pancreas

30. Murin e pasëm të bursa omentalis e formon peritoneumi parietal dhe nëpërmjet tij komunikon me organet në vijim:

- a. pancreas, lien et ren sinistra
- b. pancreas, glandula suprarenalis sinistra et ren sinistra
- c. pancreas, lien et gaster

31. Vrima hyrëse e bursa omentalis (foramen epiploicum.WINSLOWI) ka formën e ngushticës kënddrejtë dhe është i kalueshëm për:

- a. dy gisht
- b. tre gisht
- c. katër gisht

32. Vrima hyrëse e bursa omentalis (foramen epiploicum.WINSLOWI) kufizohet nga:

- a. hepar, lig. hepatoduodenalis, v. porta et pancreas
- b. hepar, duodenum, v. cava inferior et v. porta
- c. hepar, ren dexter, v.cava inferior et omentum minus

33. Kufirin ndërmjet vestibulumit dhe bursa omentalis në kuptimin e ngushtë të fjalës e formojnë këto palë peritoneale:

- a. plica gastrolinalis et plica gastropancreatica
- b. plica a. hepatica communis et plica hepatogastrica
- c. plica gastropancreatica et plica a. hepatica communis

34. Dyfishimet e mundshme të peritoneumit visceral të njohura si mesentere janë:

- a. mesenterium, mesoceleum et mesocolon ascendens
- b. mesenterium, mesocolon transversum et mesocolon sigmoideum
- c. mesenterium, mesocolon descendens et mesoduodenum

35. Trigonum lumbale-PETITI kufizohet nga:

- a. m. obliquus abdominis externus, crista iliaca et m. latissimus dorsi
- b. m. obliquus abdominis internus, lig. intertransversarium et m. transversus abdominis
- c. m. obliquus abdominis externus, crista iliaca et m. obliquus abdominis internus

36. Tetragonum lumbale-GRYNFELTI pranë m. erectoris spinae et costae XII e kufizojnë:

- a. m. obliquus abdominis externus et m. serratus posterior inferior
- b. m. obliquus abdominis internus et m. serratus posterior inferior
- c. m. transversus abdominis et serratus posterior inferior

37. Muskujt që ndërtojnë shtresën më të thellë të katrorit të muskujve të murit të pasëm të barkut janë:

- a. m. psoas major, m. quadratus lumborum et mm.intertransversarii lumborum
- b. m. psoas major, m. psoas minor et m. quadratus lumborum
- c. m. quadratus lumborum, m. transversus abdominis et m. psoas minor

38. Muskujt që ndërtojnë shtresën e parë ose sipërfaqësore të murit të pasëm të barkut janë:

- a. m. obliquus abdominus internus et m. transverses abdominis
- b. m. obliquus abdominus externus et fascia thoracolumbalis-m. latissimus dorsi
- c. m. transversus abdominis et fascia transversalis

39. Muskujt që ndërtojnë shtresën e dytë të muskujve të murit të pasëm të barkut e formojnë:

- a. m. obliquus abdominus internus et m. serratus posterior inferior
- b. m. obliquus abdominus externus et m. latissimus dorsi
- c. m. transversus abdominis et m. serratus posterior inferior

40. Shtresën e tretë të muskujve të murit të pasëm të barkut e formojnë:

- a. fascia thoracolumbalis- m. latissimus dorsi
- b. aponeurosis lumbalis- m. transversus abdominis

41. Pikat e dobëta të murit të pasëm të barkut janë:

- a. trigonum lumbalis et trigonum lumbocostalis
- b. trigonum lumbalis et tetragonum lumbalis
- c. spatium sternocostale et tetragonum lumbale

42. Fasha e cila mbulon faqen e thellë të murit të brendshëm të barkut dhe të gjitha strukturave që ndërtojnë murin e zgavrës së barkut është:

- a. fascia abdominalis
- b. fascia transversalis
- c. fascia abdominis profunda

43. Arteriet e thella të murit të zgavrës të barkut janë prej:

- a. a. thoracicae internae, aorta abdominalis et aorta thoracicae
- b. a. iliaca communis, aortae abdominalis et a. femoralis
- c. a. iliaca internae, a. femoralis et aorta thoracica

44. Cilat arterje mund të lëndohen në rast të punktionit abdominalis?

- a. a. epigastrica superficialis et a. epigastrica inferior
- b. a. epigastrica inferior et a. circumflexa ilium profunda
- c. a. circumflexa ilium superficialis et a. circumflexa ilium profunda

45. Anastomozat e sistemit të v. cava superior et v. cava inferior ndodhen në:

- a. në murin e përparëm të barkut
- b. në murin e pasëm të barkut
- c. në murin e përparëm dhe të pasëm të barkut

46. Cilat vena ndërtojnë anastomozën e regjionit umbilikal që i takojnë sistemit të v.cava superior et inferior?

- a. vv. cutanae abdominis et vv.umblicales
- b. vv. subcutanae abdominis et vv. paraumblicales
- c. vv.epigastricae superioris et vv. epigastricae inferior

47. Cilat janë degët përfundimtare të plexus lumbalis që inervojnë murin e abdomenit?

- a. n. obturatorius et n. femoralis
- b. n. genitofemoralis et n. cutaneus femoralis lateralis
- c. n. ilioinguinalis et n. iliohypogastricus

48. Cavum peritonealis ndahet në dy kate:

- a. katin e majtë dhe të djathtë
- b. katin e përparëm dhe të pasëm
- c. katin e sipërm dhe të poshtëm

49. Cili dyfishim i peritoneumit visceral e ndanë cavum peritonealis në kate?

- a. mesenterium
- b. omentum majus
- c. mesocolon transversus

50. Në katin sipërm - mbimesenkolik të cavum peritonealis ndodhen organet në vijim:

- a. hepar, lien, gaster et colon
- b. gaster, duodenum, jejunum et ileum
- c. hepar, lien, gaster et pancreas

51. Në katin e poshtëm - nënmezokolik të cavum peritonealis ndodhen organet në vijim:

- a. duodenum, jejunum, ileum et lien
- b. jejunum, ileum, colon, et gaster
- c. jejunum, ileum, cecum et colon

52. Cavum peritonealis është e mbyllur qorrazi:

- a. te meshkujt
- b. te femrat
- c. te meshkujt dhe femrat

53. Recessuset e mëdha të përgjithshme të cavum peritonealis janë:

- a. bursa omentalis, recessus duodenalis superior et inferior
- b. bursa omentalis, recessus retroduodenalis et recessus retrocecalis
- c. bursa omentalis, recessus subphrenicus dexter et sinister

54. Organet intraperitoneale të barkut janë:

- a. gaster, duodenum, jejunum et ileum
- b. gaster, hepar, ren dexter, sinister et lien
- c. gaster, lien jejunum et ileum

55. Organet primare retroperitoneale janë:

- a. ren dexter, glandula suprarenalis dextra et v. cava inferior
- b. aorta abdominalis v. cava inferior, ren dexter et colon
- c. ren sinister, ureter, intestinum tenue et aorta abdominalis

56. Organet sekondare retroperitoneale të zgavres së abdomenit janë:

- a. gaster, duodenum et jejuno-ileumi
- b. duodenum, colon transversum, cecum et pancreas
- c. colon ascendens, descendens, duodenum et pancreas

57. Në cavum peritonealis abdominalis ndodhen të gjitha organet si në vijim:

- a. esofagu, lukthi shpretka dhe veshka
- b. lukthi, zorra e hollë, zorra e trashë dhe shpretka
- c. lukthi, zorra e hollë, zorra e trashë, rectum

58. Pjesën abdominale të esofagut e anastomozojnë venat:

- a. sistemi i v. cava inferior dhe sistemi i v. portae
- b. sistemi i v. cava superior et sistemi i v. cava inferior
- c. sistemi i v. portae et sistemi i v. cava superior

59. Në lukth dallojmë dy pjesë:

- a. pjesa vertikale dhe horizontale
- b. pjesa e sipërme dhe e poshtme
- c. pjesa e djathtë dhe e majtë

60. Pjesa e gjatë dhe vertikale e lukthit ka këto pjesë:

- a. pars cardiaca, pars pylorica et corpus ventriculi
- b. ostium cardiacum, fundus ventriculi et pars pylorica
- c. pars cardiaca, fundus ventriculi et corpus ventriculi

61. Muskujt e anterolateral të abdomenit janë:

- a. m. rectus abdominis et m. transversus abdominalis
- b. m. rectus abdominis et m. quadratus lumborum
- c. m. rectus abdominis et m. psoas major

62. Krijimet aoneurotike të m. obliquus abdominis externus formojnë lidhjet në vijim:

- a. lig. inguinalis-POUPARTI et lig. lacunaria
- b. lig. lacunaria et lig. pectinale
- c. lig. inguinalis-POUPARTI et arcus iliopectineus

63. Dyfishimi peritoneal i curvatura ventriculi major përbëhet prej tri lidhjeve e ato janë:

- a. lig. gastrolienale, lig. hepatogastricum et lig. hepatoduodenalis
- b. lig. hepatogastricum, lig. gastrocolicum et lig. gastroduodenalis
- c. lig. gastrophrenicum, lig. gastrolienale et lig. gastrocolicum

64. Lectulus ventriculi e përbëjnë së bashku këto organe:

- a. gaster, lien et duodenum
- b. ren sinister, pancreas et lien
- c. pancreas, duodenum et ren dexter

65. Lukthin e inervojnë tri plexuse vegjetative të cilat rrjedhin prej plexus coeliacus.

Plexuset e tij janë:

- a. plexus gastrici, plexus hepatis et plexus lienalis
- b. plexus gastrici, plexus duodenalis et plexus pancreaticus
- c. plexus lienalis, plexus pancreaticus et plexus renalis

66. Duodenumi ka këto pjesë:

- a. pars superior, pars inferior et pars lateralis
- b. pars superior, pars descendens et pars inferior

c. pars superior, pars descendens et pars sinistra

67. Përmendi katet e abdomenit:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

68. Cilat mure të cavum abdominalis e ndërtojnë m.rectus abdominis:

- a. _____

69. Musculus obliquus abdominis internus me skajin e poshtëm të tij ngjitet në eshtra me:

- a. _____
- b. _____

70. Fascia superficialis abdominalis e ka përforcimin në annulus inguinalis superficialis e ky është:

- a. _____

71. Cilat degë të a. thoracica interna marrin pjesë në vaskularizimin e mureve të zgavrës së barkut?

- a. _____
- b. _____

72. Cilat degë të aortae abdominalis marrin pjesë në vaskularizimin e mureve të zgavrës së barkut?

- a. _____
- b. _____

73. Cilat arterie marrin pjesë në vaskularizimin e mureve të zgavrës së barkut e që anastomozohen në regjionin umbilical:

- a. _____
- b. _____

74. Cilat janë venat që anastomozohen në murin e përparëm të abdomenit dhe i takojnë sistemit të v. cava inferior dhe sistemit të vena portae në rast të qrrregullimit të qarkullimit të v. porta formohet rrjeta venoze e quajtur caput medusa:

- a. _____
- b. _____

75. Anulus inguinalis profundus e përforcon sruktura në vijim:

- a. _____

76. Përmende emrin e palës në faqen e pasme të murit të përparëm të barkut e që ngjitet lateralisht nga a.umbilicalis-plica umbilicalis medialis:

- a. _____

77. Përmendi emrat e fossa peritoneale të cilat ndodhen në faqen e pasme të murit të përparëm të abdomenit dhe i përgjigjet hapjeve të kanalit inguinal:

- a. _____
- b. _____

78. Cilat janë dyfishimet e peritoneumit visceral që formohen në buzët e lukthit?

- a. _____
- b. _____

79. Cilat janë dy veqori të rëndësishme të peritoneumit?

- a. _____
- b. _____

80. Cilat janë katet e cavum peritonealis abdominalis?

- a. _____
- b. _____

81. Cavum peritonealis ka një sasi të vogël të lëngut që quhet:

- a. _____

82. Cavum peritonealis te gratë nuk është është i mbyllur qorrasi dhe komunikon me mesin e jashtëm nëpërmjet:

- a. _____

83. Numëro pjesët e lëvizshme të intestinum tenue mesenteriale:

- a. _____
- b. _____

84. Pjesa horizontale e lukthit emërtohet si pars pylorica dhe ndahet:

- a. _____
- b. _____

85. Lukthi ka dy buzë e ato quhen:

- a. _____
- b. _____

86. Harkun arterial të curvatura ventriculi minor e ndërtojnë:

- a. _____
- b. _____

87. Harkun arterial të curvatura ventriculi major e ndërtojnë:

- a. _____
- b. _____

88. Në bazë të marrdhënies me dyfishimin e peritoneumit parietal organet e abdomenit ndahen në:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

90. Cila pjesë e duodenumit nuk është pjesë sekondare retroperitoneale?

- a. _____

91. Zgjerimi i plexusit venoz në pjesën abdominale të ezofagut (varices ezofagei) krijohet si rezultat i hipertensionit arterial. Kjo shoqërohet edhe me qrrregullime të dy sistemeve venoze e ato janë:

- a. _____

b. _____

92. Lukthi ka dy hapje e këto janë:

- a. _____
- b. _____

93. Peritoneumi visceral e mbështjell plotësisht lukthin, e me të dy fletet e tij ngjitet në curvatura ventrikuli major et minor dhe formon dyfishimet peritoneale viscerales që quhen:

- a. _____
- b. _____

94. Omentum minus përbëhet prej dy lidhëseve e këto janë:

- a. _____
- b. _____

95. Lukthi ka dy projeksione të veqanta klinike e këto janë:

- a. _____
- b. _____

96. Në muret e lukthit janë dy plexuse nervore të veqanta e këto janë:

- a. _____
- b. _____

97. Në murin e pasëm të pjesës descendente të duodenumit hapen këto kanale pankreatike:

- a. _____
- b. _____

98. Pjesa sekondare retroperitoneale e intestinum tenue emërtohet:

- a. _____

99. Bulbus duodeni njihet me tjetër emër si:

- a. pars superior duodeni
- b. pars descendens duodeni
- c. pars inferior duodeni
- d. pars ascendens duodeni

100. Kalibri i duodenumit është më i madh:

- a. në pjesën e tij fillestare
- b. në pjesën e mesme
- c. në pjesën e tij përfundimtare

101. Pars descendens duodeni është:

- a. pjesë duodenale intraperitoneale
- b. pjesë duodenale sekondare retroperitoneale
- c. pjesë duodenale primare retroperitoneale

102. Pars superior duodeni është pjesë:

- a. intraperitoneale
- b. sekondare retroperitoneale
- c. primare retroperitoneale

103. Pars superior duodeni ndodhet në lartësi të:

- a. vërtebrës së parë të belit
- b. vërtebrës së dytë të belit
- c. vërtebrës së tretë të belit

104. Mesocolon transversum e kryqëzon mesin e faqes së përparme të:

- a. pars superior duodeni
- b. pars descendens duodeni
- c. pars inferior duodeni
- d. pars ascendens duodeni

105. Pars inferior duodeni shtrihet përpara trupit të:

- a. vërtebrës së parë të belit
- b. vërtebrës së dytë të belit
- c. vërtebrës së tretë të belit

106. Në mukozën e cilës pjesë duodenale ndodhet plica longitudinalis duodeni?

- a. pars superior duodeni
- b. pars descendens duodeni
- c. pars inferior duodeni

107. Papilla duodeni major ndodhet në:

- a. nën papilla duodeni minor
- b. sipër papilla duodeni minor
- c. jashtë papilla duodeni minor

108. Jejunumi përfaqëson:

- a. $\frac{2}{3}$ e sipërme të pjesës së lëvizshme të zorrës së hollë
- b. $\frac{2}{5}$ e sipërme të pjesës së lëvizshme të zorrës së hollë
- c. $\frac{3}{5}$ e sipërme të pjesës së lëvizshme të zorrës së hollë

109. Flexura duodenojejunalis ndodhet në:

- a. në katin mbimezekolik të abdomenit (situs abdominalis superior)
- b. në katin nënmezekolik të abdomenit (situs abdominalis inferior)
- c. në spatium retroperitonealis

110. Ansat jejunale shtrihen:

- a. horizontalisht njëra përfundi tjetrës
- b. vertikalisht afër njëra tjetrës
- c. pjesërisht horizontalisht e pjesërisht vertikalisht

111. Gjatësia e përgjithshme jejuno ileale është:

- a. 5-6m
- b. 3-5m
- c. 3-4m

112. Ostium iliocekale projektohet:

- a. në mesin e linea spinoumbilicalis e cila lidhë umbiliculin me spina iliaca anterior superior të anës së djathtë (në pikën e McBurne-it)
- b. në bashkimin e 1/3 së anës së djathtë dhe 1/3 së mesme të linea bispinalis

113. Radix mesenteri kalon nëpër:

- a. pars descendens duodeni
- b. pars inferior duodeni
- c. pars ascendens duodeni

114. Radix mesenteri është i gjatë:

- a. 10m
- b. 15cm
- c. 20cm
- d. 22cm

115. Lartësia e mesenteriumit është më e madhja në:

- a. në regjionin e flexura duodeno jejunalis
- b. rreth mesit të mesenteriumit
- c. rreth ostium iliocecale

116. Folliculi lymphatici aggregate ndodhet në:

- a. mukozë jejunale
- b. mukozë të pjesës proksimale të ileumit
- c. mukozë të pjesës terminale të ileumit

117. Flexura duodenojejunalis shtrihet:

- a. Në anën e majtë të vërtebrës së dytë lumbale
- b. Në anën e djathtë të vërtebrës së dytë lumbale
- c. Para e jashtë trupit të vërtebrës së tretë belore

118. Zorra e trashë ndodhet:

- a. Në pjesën më të madhe të katit mbimezenkolik të cavitas abdominalis
- b. Në pjesën më të madhe të katit nënmezekolik të cavitas abdominalis
- c. Në pjesën më të madhe në pelvis major

119. Tenia libera ngjitet në kolon ascendens në:

- a. faqen e përparme të tij
- b. faqen e jashtme të tij
- c. faqen e brendshme të tij

120. Cecum në marrdhënie me peritoneumin është:

- a. intraperitoneal
- b. sekondar retroperitoneal
- c. primar retroperitoneal

121. Colon transversum në marrdhënie me peritoneumin është:

- a. intraperitoneal
- d. sekondar retroperitoneal
- c. primar retroperitoneal

122. **Colon descendens në marrdhënie me peritoneumin është:**

- a. intraperitoneal
- b. sekondar retroperitoneal
- c. primar retroperitoneal

123. **Harkun e RIOLANIT e formojnë:**

- a. a. colica destra et a. sinistra
- b. a. colica media et a. colica sinistra
- c. a. colica dextra et a. colica sinistra
- d. a. colica dextra et a. colica sinistra

124. **Ostium processus vermiformis projektohet në:**

- a. Në pikën e Lanze-it
- b. Në pikën e Mc Burne-it
- c. Në pikën e Halle-it

125. **A. appendicularis është degë e:**

- a. a. cecalis ant.
- b. a. cecalis posterior
- c. a. ileoceolicae

126. **Flexura coli sinistra në marrdhënie me flexura coli dextra është:**

- a. Më lartë dhe e vendosur dyfish
- b. Më lartë dhe e vendosur në formë të palës
- c. Më poshtë dhe e zgavruar

127. **Radix mesenteri ngjitet në murin e pasëm të barkut:**

- a. prej skajit të poshtëm të veshkës së majtë deri te skaji i poshtëm i veshkës së djathtë
- b. prej skajit të poshtëm të veshkës së djathtë deri te mesi i buzës së jashtme të veshkës së majtë
- c. Prej skajit të poshtëm të veshkës së majtë deri te skaji i poshtëm i veshkës së djathtë

128. **Në katin nënmesokolik të zgavrës së barkut koloni zbritës është:**

- a. në vendosje të thellë ashtuqë koloni zbritës nuk mund të preket në murin e përparëm të abdomenit
- b. vendoset sipërfaqsisht ashtuqë ashtuqë koloni zbritës mund të preket në murin e përparëm të abdomenit

129. **Pjesa më e madhe e kolonit sigmoid ndodhet në:**

- a. fossa iliaca
- b. pelvis minor

130. **Faqja diaframatike e mëlqisë përputhet me:**

- a. faqen e poshtme të diafragmës dhe murin e përparëm të lukthit
- b. faqen e poshtme të diafragmës murin e përparëm të barkut
- c. faqen e poshtme të diafragmës murin e prapëm të barkut

131. Area nuda ndodhet në :

- a. në pjesën e përparme të faqes diaframatike të mëlqisë
- b. në pjesën e prapme të faqes diaframatike të mëlqisë
- c. facies visceralis hepatica

132. Impressio duodenalis ndodhet në faqen e poshtme të:

- a. në lobin e djathtë të mëlqisë
- b. në lobin e majtë të mëlqisë
- c. në lobin katror të mëlqisë
- d. në lobin bishtor të mëlqisë

133. Fossa ligamenti venosi ndodhet në :

- a. fissura sagitalis dextra hepatis
- b. fissura sagitalis sinistra hepatis
- c. porta hepatica

134. Nën pjesën e poshtme të lobit të djathtë të mëlqisë ndodhen:

- a. flexura coli dextra, pjesa e sipërme e duodenumit dhe pancreasi
- b. flexura coli dextra, pjesa e sipërme e duodenumit, veshka e djathtë dhe gjëndra mbiveshkore e djathtë
- c. veshka e djathtë, gjëndra mbiveshkore e djathtë, dhe pancreasi

135. Omentum minus ngjitet në:

- a. përgjatë porta hepatica et fossa ligamentum venosi
- b. përgjatë fissura sagitalis sinistra
- c. përgjatë porta hepatis et sulcus v. umbilicalis

136. Nëpër porta hepatica në mëlqi hyn dhe prej saj del:

- a. a. hepatica propria et vv. hepaticae
- b. a. hepatica propria et v. porta
- c. a. hepatica propria, vv. porta et vv. hepaticae

137. Në faqen e poshtme të lobus sinister të mëlqisë lënë impresione këto organe :

- a. pjesërisht faqja e përparme të lukthit
- b. pjesërisht faqja e prapme të lukthit
- c. këndi i majtë i colonit

138. Fossa vesicae fellae ndodhet në faqen e poshtme të mëlqisë:

- a. në pjesën e përparme të fissura sagitalis dextra
- b. në pjesën e pasme të fissura sagitalis sinistra
- c. në pjesën e përparme të fissura sagitalis sinistra
- d. në pjesën e pasme të fissura sagitalis dextra

139. Sulcus venae cave inferior ndodhet në faqen e poshtme të mëlqisë:

- a. në pjesën e përparme të fissura sagitalis sinistra
- b. në pjesën e përparme të fissura sagitalis dextra
- c. në pjesën e pasme të fissura sagitalis dextra

140. Ligamentum teres hepatis paraqet:

- a. arterien e obliteruar umbilicale
- b. venën umbilikale të obliteruar
- c. ductus omphaloentericus të obliteruar

141. Ligamentum teres hepatis ndodhet në :

- a. në buzën e sipërme të ligamentum falciformum hepatis
- b. në buzën e poshtme të lirë të ligamentum falciformum hepatis
- c. ligamentum coronarium hepatica
- d. lig. hepatoduodenalis

142. Recessus subphrenicus dexter et sinister e ndan lidhja e mëlqisë në vijim:

- a. lig. coronarium hepatis
- b. lig. falciforme hepatis

143. Rrugët më të rëndësishme extrahepatike të fshiksës së tëmthit janë:

- a. ductus hepatis communis, ductus choledocus et vesica fellea
- b. ductus hepatis dexter, ductus hepaticus sinister, ductus hepaticus communis
- c. ductus hepatis communis, ductus choledocus et ductus cysticus

144. Pancreasi ndodhet:

- a. në katin mbimesenkolik të cavum abdominalis
- b. në katin nënmesenkolik të cavum abdominalis
- c. pjesërisht në katin mbimesenkolik e pjesërisht në katin nënmesenkolik

145. Muri i përparëm i pankreasit në pjesën më të madhe i përgjigjet:

- a. faqes së pasme të lukthit
- b. spirales jejunoileale

146. Ductus pancreaticus accessorius ndodhet në pjesën e:

- a. kokës së pancreasit
- b. trupit të pancreasit
- c. bishtit të pancreasit

147. Hilum lienalis ndodhet në:

- a. facies gastrica lienalis
- b. facies renalis lienalis
- c. facies colica lienalis

148. Lozhën-shtratin e shpretkës (zona splenika) e kufizojnë:

- a. diafragma, këndi i kolonit dhe pancreasi
- b. lukthi, pancreasi dhe diafragma
- c. diafragma, lukthi dhe ren sinister

149. Në extremitas anterior të shpretkës shtrihet kjo lidhje:

- a. lig. phrenicolienalis
- b. lig. phrenicocolicus
- c. lig. gastrolienalis

150. Faqet e pasme të veshkëve janë në marrdhënie me:

- a. diafragmën, m. obliquus abdominis internus
- b. diafragmën, m. psoas major et m. quadratus lumborum
- c. vetëm me m. psoas major et m. quadratus lumborum

151. Faqja e përparme e veshkës së djathtë është në marrdhënie me:

- a. lobin e djathtë të mëlqisë dhe flexura coli dextra
- b. flexura coli dextra, lobin e katror të mëlqisë
- c. lobin e djathtë të mëlqisë dhe kolonit zbritës

152. Faqja e përparme e veshkës së majtë është në marrdhënie me të gjitha organet e poshtëpërmendura në përjashtim të:

- a. shpretkën
- b. bishtit të pankreasit
- c. flexura coli sinistra
- d. duodenumit
- e. ansave të zorrës së hollë

153. Në përbërje të medulla renalis janë të pranishme të gjitha përveq:

- a. pyramides renalis
- b. pars radiatae lobuli corticalis
- c. tubuli colligentes
- d. corcuspula renis

154. Cili mbeshtjellës i veshkës i kufizon lëvizjet e mundshme të veshkëve?

- a. capsula fibrosa
- b. capsula adipose
- c. capsula fasciale

155. Në sinus renalis ndodhen të gjitha elementet e përmendura në përjashtim të:

- a. calices minores et calices majores
- b. pelvis renalis
- c. ductus papilaris
- d. a. et v. renalis
- e. plexus renalis

156. Në përbërje të cortex renalis hyjnë këto pjesë të nefronit:

- a. corcuspula renalis et tubuli renalis contorti
- b. tubuli renalis contorti et tubuli collagens
- c. corcuspula renis, canaliculus ansiformis et tubuli colligentes

157. Cortex renis e përbëjnë:

- a. corcuspula renis et pars convolute lobuli corticalis
- b. columnna renalis et pars radiatae lobuli corticalis
- c. corcuspula renis et pars radiatae lobuli corticalis

158. Arteriola recta e cila hyn në piramidat e Malpigut të veshkëve rrjedhin prej:

- a. aa. interlobaris

- b. aa. interlobularis
- c. aa. arcuatae

159. Ureterët ndahen në dy pjesë topografike si në vijim:

- a. pars iliaca et pars pelvina
- b. pars abdominalis et pars pelvina
- c. pars abdominalis, pars iliaca et pars pelvina

160. Faqen e përparme të ureterëve e kryqëzojnë:

- a. a. et v spermatike interne et n. iliohypogastricum
- b. a. et v spermatike interne et n. genitofemoralis
- c. a. iliaca interna et n. iliohypogastricus

161. Në lartësi të linea terminalis pjesa pelvike e ureterit të djathtë e kryqëzon:

- a. a. iliaca externa
- b. pjesën e pasme të a. iliaca communis
- c. a. iliaca interna

162. Në cilën vërtebër kurrizore puthitet flexura duodenojejunalis?

- a. _____

163. Ku projektohet ostium iliocekale?

- a. _____

164. Si quhet fleta peritoneale viscerales duodenojejunale?

- a. _____

165. Tenia libera, tenia mesocolica et tenia omentalis të tria këto fillojnë nga:

- a. _____

166. Në cilën pjesë të duodenumit derdhet ductus choledocus?

- a. _____

167. Cila pjesë e pankreasit shtrihet në katin nënmesenkolik?

- a. _____

168. Si quhet projekcioni i shpretkës në murin e krahavorit?

- a. _____

169. Degë e kujt është a. suprarenalis inferior?

- a. a. phrenica inferior
- b. aorta abdominalis
- c. a. renalis
- d. v. testicularis s. ovaricae

170. Degë e kujt është v. suprarenalis dextra?

- a. v. cava inferior
- b. v. renalis
- c. v. phrenica inferior
- d. v. testicularis s. ovarice

171. Cilat fije simpatike i inervojnë gjëndrat mbiveshkore?

- a. postganglionare
- b. preganglionare

172. Ku ndodhet aorta abdominalis?

- a. Në cavum peritonealis
- b. Në hapsirën retroperitoneale

173. Cila arterie shkakton plica gastropankreatika?

- a. a. gastrica sinistra
- b. a. gastroduodenalis
- c. a. pancreatica dorsalis
- d. a. pancreaticoduodenalis inferior

174. Nëpër cilin dyfishim peritoneal ndodhet a. gastroepiploica-omentalis sinistra?

- a. lig. gastrolienalis
- b. lig. pancreaticolienalis
- c. lig. gastrocolicum
- d. lig. hepatoduodenalis

175. Degë e kujt është a. ilieocolica?

- a. a. colica media
- b. a. colica dextra
- c. a. colica sinistra
- d. a. mesenterica superior

176. Degë e kujt është a. rectalis superior?

- a. a. mesenterica superior
- b. a. mesenterica inferior
- c. a. colica media
- d. a. colicae dextrae

177. Cilat arterie e ndërtojnë rrethin e harkut arterial të Riolan-it?

- a. a. colica dextra et a. colica sinistra
- b. a. colica media et a. colica sinistra
- c. a. ileocolica et a. colica media
- d. a. ileocolica et a. colica dextra

178. Cilin dyfishim peritoneal e ngrit a. ovarica?

- a. lig. ovari proprium
- b. lig. suspensorium ovari
- c. mesosalpinx
- d. mesoovarium

179. Arterja coeliaca sinistra është degë e:

- a. a. colica media
- b. a. colica dextra
- c. a. mesenterica superior
- d. a. mesenterica inferior

180. Pika kritike e SUDEK-UT është anastomoze e cilave enë të gjakut?

- a. a. sigmoidea ima (dega descendente e a. sigmoide të poshme) et a. rectalis superior
- b. a. sigmoidea media et a. sigmoidea ima
- c. a. sigmoidea superior a. sigmoidea media
- d. a. colica sinistra et a. sigmoidea superior

181. Cila enë gjaku kalon përgjatë arterieve dhe i ndan-kryqëzon?

- a. v. renalis sinistra
- b. v. cava inferior
- c. a. renalis sinistra
- d. v. suprarenalis media

182. V. testicularis sinistra derdhet në:

- a. v. cava inferior
- b. v. renalis sinistra
- c. v. phrenica inferior
- d. v. suprarenalis media

183. Cila degë e aortës abdominale e vaskularizon diafragmën?

- a. a. pericardiophrenica
- b. a. phrenica inferior
- c. a. phrenica superioris
- d. a. musculophrenica

184. Cila arterie është degë e truncus celiacus?

- a. a. gastrica sinistra
- b. a. gastrica dextra
- c. a. colica sinistra
- d. a. pancreaticoduodenalis inferior

185. Degë e kujt është a. hepatica propria?

- a. gastroduodenalis
- b. a. pancreatico dorsalis
- c. a. hepatica communis
- d. a. lienalis

186. Cili prej tri elementeve i takon trekëndëshit të fshiksës së tëmthit?

- a. a. cystica, ductus hepaticus comunis, ductus cysticus
- b. a. hepatica propria, ductus cysticus et truncus cysticus
- c. a. cystica, ductus choledocus et ductus cysticus
- d. a. cystica, ductus choledocus et a. hepatica propria

187. Cila pjesë e duodenumit përmban më shumë vile?

- a. pars superior duodeni
- b. pars inferior duodeni
- c. pars descendens duodeni
- d. pars ascendens duodeni

188. Cila nga këto arterie njihet si degë anësore e a. iliaca externa?

- a. a. circumflexa ilium superficialis

- b. a. epigastrica inferior
- c. a. epigastrica superior
- d. a. epigastrica superficialis

189. Në cilën enë venoze derdhen vv. hepaticae?

- a. v. portae
- b. v. cave inferior
- c. v. renalis dextra
- d. v. mesenterica superior

190. Nëpër cilin ligament (dyfishim peritoneal) kalon a. hepatica propria?

- a. lig .hepatogastricum
- b. lig. gastrocolicum
- c. lig hepatoduodenalis
- d. mesenterium

191. Cili prej dyfishimeve peritoneale paraqet shtypje në raport me a. lienalis?

- a. recessus subphrenicum
- b. bursa omentalis
- c. recessus retroduodenalis
- d. recessus duodenalis superior

192. Cila arterie paraqitet si degë e a. gastroduodenalis?

- a. a. gastrica dextra
- b. a. gastroepiploica dex.-a. gastromentalis dex.
- c. a. gastroepiploica sin.
- d. a. pancreaticoduodenalis superior

193. A është e lëvizshme glandula suprarenalis nëse veshka lëviz:

- a. po
- b. jo

194. Cili ganglion hyn në përbërje të plexus aorticus abdominalis?

- a. g. mesentericum inferius
- b. g. mesentericum inferius et superior
- c. g. mesentericum superius
- d. g. mesentericum superius et ganglia aorticorenalia

195. Cilat janë degë simpatike të plexusit celiac?

- a. n. splanchnicus major, minor et n. phrenicus
- b. n. splanchnicus major, minor et pl. hypogastricus superior
- c. n. splanchnicus major, minor, nn.splanchnici lumbales dhe degët e pl. aorticoabdominalis

196. Rretho përgjigjen e cila i përket plexus celiacus:

- a. është një qift i degëve vegetative të trupit të njeriut
- b. inervon organet e zgavrës së barkut dhe gjëndrave gjenitale
- c. pranon fjetet nervore parasimpatike sjellëse prej nn.erigentes

197. Sistemi simpatik i pjesës abdominale:

- a. është qift i trungut, i lokalizuar në të dy anët e pjesës lumbale të shtyllës kurrizore
- b. nuk është qift i trungut parasimpatik, që përcjell aortën abdominale
- c. janë degë të nn. lumbales
- d. përmban ganglion mesentericum superior

198. Cilat janë degët hyrëse-aferente të plexus aorticus abdominalis?

- a. plexus mesentericus inferior, pl. iliaci, plexus hypogastricus superior, pejzat për plexus celiacus
- b. plexus mesentericus superior, plexus mesentericus inferior, pl. iliaci, plexus hypogastricus superior
- c. plexus mesentericus superior, plexus mesentericus inferior, pl. iliaci, plexus hypogastricus superior, pejzat e plexus celiacus

199. Rretho përgjigjen e saktë e cila bën fjalë për plexus aorticus abdominalis:

- a. kjo është pjesë abdominale e sistemit nervor parasimpatik
- b. përmban ganglione celiake
- c. përmban ganglione aorticorenale
- d. pranon fije preganglionare sensitive të nn. splanchnicus lumbales

200. Deget parasimpatike hyrëse-sensitive të plexus celiacus janë:

- a. djathtas n. phrenicus dhe të dy nn. vagus
- b. n.vagus dexter et n. phrenicus dexter
- c. dy nervat vagus et nn.erigentes
- d. n.vagus i djathtë, n. phrenicus i djathtë et nn. erigentes

201. Plexus subserosus në muret e zorrëve të holla përbëjnë:

- a. fijet parasimpatike
- b. fijet simpatike
- c. fijet simpatike et fijet parasimpatike

202. Ganglioni celiac është:

- a. ganglion qift
- b. ganglion jo qift
- c. i pa lidhur me ganglionin e dytë të plexus celiacus

203. Cili prej shembujve për plexus celiacus nuk është i saktë:

- a. jep numrin më të madh të fijeve për plexus aorticus abdominalis
- b. përmban 6 ganglione
- c. deget e saj motorike-sjellëse vijnë deri te organet që inervojnë dhe formojnë gërshetimin peritoneal
- d. degët motorike të tyre janë të dedikuara për inervimin e organeve abdominale dhe gjëndrave gjentile

204. Fijet parasimpatike të colon descendens në pjesën më të madhe janë me prejardhje nga:

- a. n. vagus dexter
- b. n. phrenicus dexter
- c. nn. erigentes
- d. n. splanchnicus lumbalis II

205. Cila prej këtyre përgjigjeve për plexus aorticus abdominalis është e saktë?

- a. është trung simpatik qift i lokalizuar në pjesën paravertebrale
- b. nuk është trung parasimpatik qift që e rrethon aorta abdominalis
- c. nuk është trung simpatik qift që e rrethon aorta abdominalis

206. Nn. splanchnicus lumbalis janë:

- a. degët motorike të ganglioneve simpatike të belit
- b. degët sensitive të ganglioneve simpatike të belit
- c. degët sensitive të ganglioneve simpatike për plexus celiacus

207. Në sa grupe janë të ndara nodi lymphatici lumbalis?

- a. në dy grupe
- b. në 4 grupe
- c. në 3 grupe

208. Në grupin e gjëndrave paraaortike mbarojnë këto enë limfatike në:

- a. të gjitha organet abdominale intra dhe retroperitoneale
- b. të gjitha organet abdominale intraperitoneale dhe retroperitoneale sekundare
- c. të gjitha organet abdominale retroperitoneale sekundare

209. Cilat grup të gjëndrave limfatike i takojnë nodi lymphatici mesenterici superior?

- a. grupit paraaortik
- b. grupit retroparaaortik
- c. grupit paraaortik
- d. grupit coeliac të gjëndrave limfatike

210. Cila prej përgjigjeve është e saktë për ductus thoracicus?

- a. përbëhet me lidhjen e truncus lumbalis dexter et sinister et truncus intestinalis
- b. pjesa fillestare është e zgjeruar si rrjetë
- c. e drenon krejt limfën nga krejt pjesa e poshtme e trupit
- d. prej thoraksit nëpërmes hiatus ezophageus hyn në abdomen

211. Në grupin e gjëndrave paraaortike limfatike nuk mbarojnë enë limfatike të:

- a. murit të pasëm të barkut
- b. të gjitha organeve retroperitoneale
- c. të gjitha organeve sekundare retroperitoneale
- d. gjëndrave gjenitale

212. Ku ndodhet abdomeni?

- a. në pjesën e mesme të trupit në mes të thoraxit dhe pelvis minor dhe gjymtyrëve të poshtme
- b. në mes të pelvis minor dhe pelvis major
- c. mbi thorax

213. Cilat organe e mbushin zgavrën e abdomenit?

- a. organet e rrugëve të frymëmarrjes
- b. pjesa më e madhe e organeve të rrugëve të tretjes dhe pjesa abdominale e rrugëve urinare
- c. organet reproduktive

214. Nga qka përbëhet abdomeni?

- a. nga muret e tij
- b. zgavra e tij
- c. muret dhe zgavra e tij

215. Si ndahen kufijt e abdomenit?

- a. kufijt e sipërfaqshëm
- b. kufijt e thellë
- c. kufijt e sipërfaqshëm të sipërm e poshtëm dhe kufijt e thellë të sipërm dhe të poshtëm

216. Cili është kufiri i sipërfaqshëm i sipërm?

217. Cili është kufiri i sipërfaqshëm i poshtëm?

218. Cili është kufiri i thellë i sipërm?

219. Cili është kufiri i thellë i poshtëm?

220. Apertura pelvis superior bën të mundur komunikimin në mes të:

- a. pelvis minor dhe pelvis major
- b. zgavrës së toraxit dhe zgavrës së abdomenit
- c. zgavrës së abdomenit dhe zgavrës së pelvikut

221. Linea terminalis e ndan:

- a. pelvis minor nga pelvis major
- b. zgavrën e abdomenit nga pelvis minor
- c. zgavrën e abdomenit nga zgavra e thoraxit

222. Përmendi vijat projektuese të abdomenit:

223. Linea bispinalis kënd e bashkon?

- a. spina iliaca anterior superior dhe umbiliculin
- b. spina iliaca anterior superior të anës së djathtë dhe majtë
- c. umbiliculin me fossa axillaris

224. Linea spinoumbilicalis kënd e bashkon dhe si quhet ndryshe?

225. Linea e Desjardinsit kënd bashkon?

- a. spina iliaca ant. sup. dhe umbiliculin
- b. umbiliculin dhe fundin e fossa axillaris të anës së djathtë
- c. spina iliaca anterior superior të anës së djathtë dhe majtë

226. Kënd bashkon linea kostoklavicularis?

227. Cilat janë pikat projektuese të abdomenit?

228. Cilat janë sulcuset e mureve të abdomenit:

- a. sulcus mediana ant., sulcus mediana lateralis
- b. sulcus mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus mediana lateralis

229. Në cilen hulli të murit të abdomenit ndodhet linea alba?

- a. sulcus mediana ant.
- b. sulcus mediana post.
- c. sulcus mediana lateralis

230. Sulcus mediana anterior në cilat gropa hapet poshtë dhe sipër?

- a. fossa epigastrica superior sipër dhe zgjerohet në mons pubis
- b. në deltoidin lumbocostal të Michaelisit

231. Sulcus mediana posterior në sa gropa zgjerohet dhe si quhen ato?

- a. fossa epigastrica superior
- b. hapet në katër gropa të quajtura deltoidi lumbocostal i Michaelisit

232. Si ndahen fashat e mureve të abdomenit?

- a. _____
- b. _____

233. Prej ku shtrihet e ku mbaron linea alba?

234. Fascia superficialis abdominalis është e përforcuar në fascia inguinalis superficialis me:

- a. _____

235. Fascia superficialis abdominalis mbështjell:

- a. _____

236. Fascia transversalis abdominalis mbështjell:

- a. m.transversus abdominis, m.rectus abdominis, m.quadratus lumborum, m. psoas major, m. iliacus dhe veshkët
- b. m. obliquus abdominis int., m.rectus abdominis
- c. m. erector spinae, m. obliquus abdominis int., m.rectus abdominis

237. Cilat janë fletët e vaginës m. rectus abdominis?

- a. _____
- b. _____

238. Cilat janë fashat e murit të përparëm të abdomenit?

- a. _____
- b. _____

239. Cilat janë fashat e murit të prapëm të abdomenit?

- a. _____
- b. _____

- c. _____
d. _____

240. Cilat janë pikat e dobëta të murit të përparëm të abdomenit?

241. Cilat janë pikat e dobëta të murit të prapëm të abdomenit?

242. Fascia superficialis abdominalis është e përforcuar në pjesën e poshtme të vijës së barkut me:

- a. _____
b. _____

243. Nga cilat kolaterale fillestare formohet v. cava inf.?

- a. v. iliaca comunis dextra et v. iliaca comunis sinistra
b. v. iliaca externa et v. iliaca externa sinistra
c. v. iliaca interna dextra et v. iliaca interna

244. Cilat vena derdhen në vena renalis sinistra?

- a. v. suprarenalis sinistra, v. capsularis, v. testicularis/ovarica
b. v. epigastrica superior, v. musculophrenica
c. v. iliolumbalis, v. lumbalis

245. Kolateralet direkte viscerales të v. cava inferior janë:

- a. v. phrenica inf. et v. lumbalis
b. v. hepatica, v. suprarenalis, v. renalis, v. testicularis/ovarica
c. v. phrenica inf., v. lumbalis, v. suprarenalis et v. renalis

246. Venat e sipërfaqshme të murit të abdomenit janë:

- a. v. epigastrica superficialis et v. epigastrica inf.
b. v. epigastrica superior, v. circumflexa superficialis
c. v. epigastrica superficialis, v. circumflexa superficialis et v. thoracoepigastrica

247. Cilat janë venat e thella të murit të abdomenit?

- a. v. epigastrica superior, v. musculophrenica, v. epigastrica inf., v. circumflexa iliaca profunda, v. iliolumbalis, v. lumbalis et v. intercostalis
b. v. epigastrica superior, v. musculophrenica, v. epigastrica sup. v. cava inf

248. Ku derdhet v. suprarenalis sinistra?

- a. v. cava inf.
b. v. renalis sin.
c. v. porta

249. Ku derdhet v. renalis?

- a. v. cava inf.
b. v. porta
c. v. cava sup.

250. Ku ndodhet tuber omentale?

- a. ndërmjet impressio gastrica dhe lig. venosi

- b. ndërmjet impressio esophagealis dhe lig. venosi
- c. ndërmjet impression colica dhe lig. venosi

251. Çka projektohet në pikën që formohet nga vija që tërhiqet nga umbilicus e pritët me buzën e jashtme të m. rectus abdominis-pikën e Bazeit?

- a. pelvis renalis
- b. veshka
- c. ureteri

252. Çka projektohet në pikën që formohet në bashkimin e 1/3 së jashtme dhe mesme të linea bispinalis pikën e Halleut?

- a. flexura marginalis ureteri
- b. veshka
- c. fshiksa e tëmthit

PËRGJIGJET E SAKTA NË ABDOMEN

1	a.
2	b.
3	c.
4	a.
5	b.
6	b.
7	a.
8	c.
9	b.
10	b.
11	c.
12	a.
13	b.
14	a.
15	c.
16	b.
17	b.
18	a.
19	(a.)b.
20	a.
21	(b.)c.
22	(b.)c.
23	b.
24	b.
25	b.
26	b.
27	a.
28	c.
29	a.
30	b.
31	a.
32	b.
33	c.

34	b.
35	a.
36	b.
37	a.
38	b.
39	a.
40	b.
41	b.
42	b.
43	a.
44	b.
45	c.
46	b.
47	c.
48	c.
49	c.
50	c.
51	c.
52	a.
53	c.
54	c.
55	a.
56	c.
57	b.
58	c.
59	a.
60	c.
61	a.
62	a.
63	c.
64	b.
65	a.
66	b.
67	Epigastrium, mesogastrium, hypogastrium
68	Muri i përparëm i anshëm
69	a. crista iliaca (linea intermedia) b. os pubis
70	a. fibrae intercrurales
71	a. a.epigastrica superior b. a.musculophrenica
72	a. aa.lumbalis b.aa.phrenicae inferiores
73	a. a.epigastrica superior b. a.epigastrica inferior

74	a. vv.paraumbilicales b.vv.subcutaneae abdominis
75	a. lig. interfoveolare Hesselbachi
76	a.plica-umbilicalis lateralis
77	a. fovea inguinalis medialis b. fovea inguinalis lateralis
78	a.omenta (omentum majus et minus
79	a. pengon fërkimin në mes të organeve dhe fletëve të tij b. mundëson- absorbimin e lëngjeve që mblidhen në zgavrën e abdomenit
80	a. situs abdominis superior b. situs abdominis inferior
81	a. liquor peritonealis
82	a. ostium abdominalis tuba uterine
83	a. jejunum b. ileum
84	a. antrum pyloricum b. canalis pyloricus
85	a. curvatura ventriculi major b. curvatura ventriculi minor
86	a. a. gastrica dextra b. a. gastrica sinictra
87	a. a. gastroepiploica b. a. gastroepiploica
88	a. intraperitoneal b. primar retroperitoneal c.sekondar retroperitoneal
89	a. peritoneumi visceral
90	a. pars superior
91	a. sistemi i vena cava b. sistemi i vena porta
92	a. ostium cardiacus b.ostium pyloricus

93	a. omentum majus b. omentum minus
94	a. lig. hepatogastricus b. lig. hepatoduodenalis
95	a. trekëndshi i Labbeut i lukthit b. hapsira e Traubeut (spatium semilunare)
96	a. plexus myentericus b. plexus submyentericus
97	a. ductus pancreaticus acessorius b. ductus pancreaticus
98	a. duodenum
99	a.
100	a.
101	b.
102	a.
103	a.
104	b.
105	c.
106	b.
107	a.
108	b.
109	b.
110	a.
111	a.
112	a.
113	b.
114	b.
115	b.
116	c.
117	a.
118	b.
119	a.
120	a.
121	a.
122	b.
123	b.
124	a.
125	b.
126	a.
127	b.
128	a.
129	b.
130	b.
131	b.
132	a.

133	b.
134	b.
135	a.
136	b.
137	a.
138	a.
139	c.
140	b.
141	b.
142	b.
143	b.
144	c.
145	a.
146	a.
147	a.
148	c.
149	b.
150	b.
151	a.
152	d.
153	d.
154	b.
155	c.
156	a.
157	a.
158	c.
159	b.
160	a.
161	a.
162	Në vërtebrën e dytë belore
163	Në pikën e McBurney
164	Mesenterium
165	Ostium processus vermiformis
166	Pars descendens
167	Processus uncinatus
168	Zonën splenike
169	c.
170	a.
171	b.
172	b.
173	a.
174	a.
175	d.
176	b.
177	b.
178	b.
179	d.

180	a.
181	a.
182	b.
183	b.
184	a.
185	c.
186	a.
187	b.
188	b.
189	b.
190	c.
191	b.
192	b.
193	b.
194	a.
195	c.
196	b.
197	a.
198	a.
199	d.
200	b.
201	b.
202	a.
203	b.
204	c.
205	c.
206	a.
207	b.
208	b.
209	a.
210	d.
211	c.
212	a.
213.	c.
214	c.
215	c.
216.	Procesus xyphoideus, arcus costalis, vërtebra e XII thoracale
217	Buza e sipërme e simfizës pubike, plica inguinalis, crista iliaca
218	Faqja e poshtme e diafragmës
219.	Linea terminalis
220	c.
221	a.
222	Arcus costalis, plica inguinalis, crista

	iliaca, linea mediana ant., linea bispinalis, linea e Monrout-spinoumblikale, linea e Desjardinsit dhe linea costoclaviculare
223.	b.
224.	Bashkon umbilikusin me spina iliaca ant. sup. Ndryshe quhet linea e Monrout
225	b.
226.	Skajin e përparëm të brinjës së XII dhe fundin e fossa axilaris të anës së majtë
227	Umbilikusi, pika e Bruneit, Bazeit, Halleit, Lanzit.
228	b.
229	a.
230	a.
231	b.
232	a. fashat e murit të përparëm b. fashat e murit të pasëm
233.	Shtrihet nga processus xyphoideus e deri te simfiza pubike si adminiculum linea alba
234.	Fibrae intercrurales
235.	m. obliquus abdominis externus
236.	a.
237.	a. lamina. ant. b. lamina posterior
238.	a. fascia superficialis abdominalis b. fascia transversalis abdominis
239.	a. fascia superficialis dorsi b. fascia toracodorsalis c. aponeurosis lumbalis d. fashat e thella si e m. quadratus lumborum dhe psoas major
240	canalis inguinalis, anuluset inguinale,

	annulus umbilicalis, foveola linea alba, sulcus lateralis vagina musculi abdominalis
241.	Trigonum dhe tetragonum lumbale
242.	Lig. fundiforme penis dhe lig. suspensoris penis-clitoridis
243	a.
244	a.
245	b.
246	c.
247	a.
248	a.
249	a.
250	a.
251	a.
252	a.